

گزارش یک مورد لیپوم بزرگ دروفارنژیال

*دکتر فتح الله یعنود^۱، دکتر فرناز هاشمیان^۲

^{۱۲} استاد پارگروه گوش، گلو و یعنی - دانشگاه علوم پزشکی همدان

خلاصه

معرفی بیمار: خانم ۶۰ ساله ای با سابقه دیسفاری و خرخر شبانه پیشرونده که شروع دقیق آن را نمی داند به درمانگاه گوش، گلو و بینی بیمارستان امام (ره) همدان مراجعه کرده است. در معاینه بالینی یک توده نرم باندازه 6×6 سانتیمتر در طرف راست گردن بیمار درست زیر عضله استرنوکلیدوماستوئید لمس می شد. در معاینه ارووفارنرنسکس توده بر جسته ای در زیر مخاط دیواره خلفی ارووفارنرنسکس دیده می شد که در لمس قوام نرم داشته و مخاط روی آن سالم بود. در بررسی CT با کتراست توده ای رادیولوست که از سطح استخوان همیوید در پایین تا نازوفارنرنسک در بالا ادامه داشت دیده شد. به علت حجم زیاد تومور حنجره و تراشه به جلو و طرف مقابل و شریان کاروتید و ورید ژوگولر داخلی به طرف جانبی وعقب رانده شده بودند. توده مزبور از طریق برش گردنی عرضی به صورت یک جا خارج شد و تمام سیستم عروق و اعصاب موضع حفظ شدند. در بررسی پاتولوژی یک لیپیوم کپسول دار به ابعاد $4\times 8\times 10$ سانتیمتر تایید شد.

واژه های کلیدی: سیوم، رتروفارنژیال، دیسفارژی

مقدمة

فضای رتروفارنژیال بین لایه میانی و عمقی فاسیای عمقی گردن قرار گرفته و به طور طبیعی حاوی مقدار ناچیزی بافت چربی است. این فضای قاعده جمجمه تا مدیاستن کشیده شده است به طوری که می‌تواند به صورت یک کانال ارتباطی باعث گسترش عفونت و یا تومور از گردن به مدیاستن شود.^(۱)

تومورهای فضای رتروفارنژیال شایع نیستند و اغلب زمانی حال همیشه احتمال لیوسارکوم را باید در نظر داشت.^(۴)

۵

وانسداد راه هوایی بروز می کنند^(۲). تا سال ۲۰۰۱ جمما ۳۱ مورد لیوم ناجیه رتوفارنژیال گزارش شده این در حالی است که لیوم شاعرین تومور خوش خیم و پسپول دار بافت نرم زیر پوست است^(۳).

آدرس: همدان-سیمارستان امام خمینی(ره) بخش گوش، گلو و سینه

تلف: تماس: ۹۱۸۱۱۱۵۵۹۵ Email: Behnoud344@yahoo.com

八〇八〇年十一月七日

دریج و مسون: دریج دیگر

دیده می شود. از نظر پاتولوژی روش نیست، لیوم یک تنوپلاسم واقعی یا مالفرماسیون و یا هیپرپلازی بافت چربی است. شواهدی از آنالیز سلولی لیومها نشان داده است در ۷۰٪ موارد آنها یک اختلال ساختن سلول (Cytogenetic Abnormality) در منطقه ۱۲q۱۳q۱۵ وجود دارد. فضای رتروفارنژیال بین لایه میانی و عمقی فاسیای عمقی گردن قرار دارد و از قاعده جمجمه در بالاتا مدیاستن در پایین کشیده شده است.

تومورهای اولیه این فضا مخصوصاً لیومها بسیار نادر هستند. اگر چه لیوم توموری خوش خیم و با سیر کند می باشد ولی ندرتا می تواند بدون کپسول بوده و به داخل بافت های مجاور پخش شود (۱). یک فرم غیر معمول لیوم با سلول دوکی وجود دارد که اغلب در مردان مسن دیده می شود و از نظر هیستولوژی می تواند با لیوسارکوم اشتباه شود. موردنادر و جالی از پخش بافت چربی ناحیه اطراف گردن دیده می شود که به نام بیماری مادلانگ (Madelung's Disease) شناخته شده و به صورت یک بدشکلی در اطراف گردن دیده می شود ضمن این که در این جا بافت چربی دارای کپسول نیست و به صورت زبانه هایی در لابای رشته های عضلات کشیده شده اند (۶).


نمای لیوم در CT و MRI خیلی خوب قابل تشخیص است، اگر چه همیشه احتمال وجود لیوسارکوم را باید در نظر داشت. بدینهی است تشخیص قطعی توسط پاتولوژیست داده می شود اما CT یا MRI اما با جراحی تشخیص صحیح لیوم را بدهند و بنابراین برنامه ریزی عمل جراحی با دقت بیشتری انجام می شود (۷).

از جهت مقایسه عالیم بالینی بیمار ما هیچ اختلافی با سایر موارد گزارش شده نداشت به طوری که اشکال در بلع و تنفس به صورت خرخر (Snoring) بارزترین شکایت او بود در حالی که همزمان توده ای نسبتاً بزرگ در گردن داشت. نادر بودن این تومور در این ناحیه نیز علت معرفی آن به صورت گزارش موردعی است.

بوست روی توده کاملاً سالم و هیچگونه چسبندگی به تومور ندارد و در بررسی گردن آدنوپاتی و نکته پاتولوژیک دیگری یافت نشد.

در معاینه اروفارنکس یک توده برجسته در زیر مخاط دیواره خلفی اروفارنکس که در لمس کاملاً نرم و مخاط روی آن سالم بود دیده شد. در معاینات عمومی هیچ گونه مورد غیر طبیعی یافت نشد و آزمایشات روتین هماتولوژیک نرمال گزارش شدند. گرافی قفسه سینه نیز طبیعی گزارش شد.

در بررسی سی تی باکتراست توده ای رادیولوست در فضای رتروفارنژیال دیده شد که از ناحیه نازوفارنکس در بالا تا سطح استخوان هیوبید در پایین ادامه داشت به طوری که با ایجاد فشار حنجره و تراشه را به جلو و طرف مقابل و شیت کاروتید را به طرف جانبی وعقب جایجا کرده بود (شکل ۱). توده مذکور از طریق برش عرضی گردن با دیسکسیون بسیار راحت به صورت یکجا و کامل خارج شد و تمام سیستم عروق و اعصاب موضع عمل حفظ شدند. در بررسی هیستولوژیک تومور، لیوم کپسول دار با سلول های چربی بالغ و ابعاد در ۴×۸×۱۰ سانتیمتر گزارش شد.



تصویر ۱: سی تی اسکن با کتراست توده رادیولوست را در فضای رتروفارنژیال نشان می دهد که از ناحیه نازوفارنکس در بالا تا سطح استخوان هیوبید در پایین ادامه دارد.

بحث

لیوم شایعترین تومور خوش خیم و کپسول دار بافت نرم زیر بوست است. حدود ۱۳٪ لیوم ها در ناحیه سر و گردن ایجاد می شوند که معمولاً در پشت گردن و در مردان بیشتر

Reference

- 1-Garth LC, Haddad J .Otolaryngology Head and Neck Surgery 4th ed. Philadelphia: Mosby; 2005.p.2563.
- 2- Hockstein NG, Anderson TA, Moonis G,Gustafson KS, Mirza N.Retropharyngeal lipoma causing obstructive sleep apnea. Laryngoscope 2002; 112(9):1603-5.
- 3-Senchenkov A, Werning JW, Staren D. Radiographic assessment of the infiltrating retropharyngeal lipoma .Otolaryngol Head and Neck Surg 2001;125:658-60.
- 4- Davis WL, Harnsberger HR, Smoker WR et al. Retropharyngeal space : evaluation of normal anatomy and disease with CT and MRI imaging .Radiology 1990;174:59-64.
- 5- Eisele DW, Landis GH. Retropharyngeal infiltrating lipoma:a case report. Head and Neck Surg 1988;10:416-21.
- 6- Monem MH, Gaafar AH, Magdy EA. Lipoma of the head and neck :presentation variability and diagnostic work-up. Laryngol otol 2006;120(1):47-55.
- 7- Rosell A, Arrang G, Liavero MT et al. Imaging case study of the month: lipoma of the retropharyngeal space .Ann Oto Rhino laryngol 1998;107:726-8.

Abstract**A case report of huge retropharyngeal lipoma**

Behnoud F. MD, Hashemian F. MD

Case report :A60-year-old woman presented to the Ear, Nose, Throat out patient clinic of Imam hospital , Hamedan, with history of slowly progressive dysphagia and snoring. She did not know anything about beginning of her history. Clinical examination revealed a soft mass: measuring approximately 6×6 cm. in the right side of the neck, just under sternocleidomastoid muscle. Inspection of the oropharynx demonstrated a submucosal bulging of the posterior pharyngeal wall which on palpation was homogeneous and doughy, and the overlying mucosa was normal. CT study with contrast revealed a huge radiolucent mass extending from nasopharynx to the level of the hyoid bone and which displaced the larynx and trachea anterolaterally and carotid sheet posterolaterally. The mass was resected en bloc by a transcervical approach, and all neurovascular in that region were preserved. Histological evaluation revealed a lipoma measuring 10×8×4cm.

Key word: Lipoma, Retropharyngeal, Dysphagia.